

Ratarske kulture:

strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, uljana repica, duvan.

VРЕМЕ ПРИМЕНЕ	НАЧИН ПРИМЕНЕ
SETVA	30-50ml / 2dl vode, potopiti semе 30 min ili ostaviti da naklija
U SVIM FENOFАЗАМА РАЗВИЋА, USAGLAŠENO SA REDOVНИМ АГРОТЕХНИЧКИМ МЕРАМА	folijarno, samostalno ili zajedno sa pesticidima š.repa - mešati sa fungicidima za <i>Cercosporu sp</i>

Povrće:

paradajz, paprika, krastavac, salata, kupus, grašak, krompir, boranija, korenasto i krtolasto povrće.







VРЕМЕ ПРИМЕНЕ	НАЧИН ПРИМЕНЕ
SETVA	30-50ml / 2dl vode, potopiti semе 30 min ili ostaviti da naklija
RASAD	100ml / 10l vode, zalihati 1-2 puta nedeljno
FOLIJARNO	50ml / 10l vode prskati samostalno ili zajedno sa fungicidima
SISTEM КАР ПО КАР	1-2ml / m ² na 7-10 dana




Cveće:






ruže, hrizanteme, petunije, muškatne i drugo sobno cveće.

VРЕМЕ ПРИМЕНЕ	НАЧИН ПРИМЕНЕ
SETVA	30-50ml / 2dl vode, potopiti semе 30 min ili ostaviti da naklija
RASAD	100ml / 10l vode, zalihati 1-2 puta nedeljno
FOLIJARNO	50ml / 10l vode prskati samostalno ili zajedno sa fungicidima
SISTEM КАР ПО КАР	1-2ml / m ² na 7-10 dana

Voće

JABУЧАСТО ВОЋЕ (JABUKA, KRUŠKA, DUNJA...)					
Slavol se primenjuje folijarno u dozi od 10-15l / ha, sa tretmanima redovne zaštite sa pesticidima (fungicidi, insekticidi) ili samostalno. Može se mešati sa svim preparatima. Vreme primene Slavola nije vezano za karenco. Ne treba tretirati po sunčanom delu dana, već ujutru ili uveče.					
Vrste primene (jabuka):					
					
1. Po precvetavanju, kada je formiran plod i lisna rožeta sa 10l/ha	2. Kada je plod veličine lešnika-oraha, sa redovnom zaštitom sa 10l/ha	3. U fazi naličivanja plodova sa 15l/ha	4. U toku jula i avgusta sa 15l/ha	5. 7-10 dana pred berbu sa 15l/ha	Postiže se veća krupnoca, obojenost plodova i veći broj rodnih pupoljaka.

КОШИЧАВО ВОЋЕ (BRESKVA, ŠLIJAVA, KAJSIJA, TREŠЊA, VIŠNJA...)					
Slavol se primenjuje folijarno u dozi od 10-15l / ha, sa tretmanima redovne zaštite sa pesticidima (fungicidi, insekticidi) ili samostalno. Može se mešati sa svim preparatima. Vreme primene Slavola nije vezano za karenco. Ne treba tretirati po sunčanom delu dana, već ujutru ili uveče.					
Vrste primene (breskva):					
					
1. Po precvetavanju sa 10l/ha	2. Kada je plod veličine zrna graška-oraha sa 10l/ha	3. Posle poređivanja plodova sa 15l/ha	4. U fenofazi naličivanja plodova sa 15l/ha	5. Kada plod počinje da menja boju sa 15l/ha	

Vrste primene (trešnja):					
					Primenom Slavola postiže se veća krupnoca i obojenost plodova.
Tretiranjem Slavolom povećava se masa ploda, smanjuje se proredjivanje i opadanje plodova, plodovi su ujednačeni i intenzivno obojeni. Nakon berbe a u toku vegetacije, koštičavo voće tretirati Slavolom u dozi 10l / ha, čime će se poboljšati broj cvetnih pupoljaka (diferencijacija) formiranih za sledeću rodnu godinu.					

JAGODIČАСТО ВОЋЕ (JAGODA)					
Potapanje u 2% rastvora Slavola minimum pola sata pre sadnje. Zalivanje ovim rastvorom po zavrsetku sadnje.					
Vrste primene:					
<input type="checkbox"/> folijarno - sa 10l / ha uz redovnu zaštitu ili na svakih deset dana kroz sistem za navodnjavanje - 1-2ml, ili preračunato 1l na 100l vode. Biljke prvo zaliti sa 2/3 potrebne vode za zalivanje, potom Slavol rastvoriti u preostalu količinu vode. Tretmani se izvode sa svakim redovnim zalivanjem. <input type="checkbox"/> bitan momenat početka primene Slavola je kada počinje vegetacija i pojave se prvi listići u središtu živča jagode.					

Slavol utiče na krupnoco, obojenost ploda, više cvetova po cvetnoj grani, ranije sazrevanje za 5-10 dana, zavisno od sorte i starosti zasada.

MALINA, KUJPINA, RIBIZLA, OGROZD, BOROVNICA					
<input type="checkbox"/> od faze precvetavanja uz redovnu zaštitu ili samostalno svakih 15 dana (jednom u dve nedelje) do 7-10 dana pred berbu u dozi 10-15l / ha (1-1,5l na 100l vode)					

VINOVА LOZA					
<input type="checkbox"/> pre cvetanja - 10l / ha uz redovnu zaštitu ili samostalno <input type="checkbox"/> po precvetavanju - 10l / ha <input type="checkbox"/> u fazi formiranja grozda sa 10l / ha <input type="checkbox"/> u fazi zatvaranja grozda i naličivanja bobice sa 15l / ha <input type="checkbox"/> u fazi šarka i 7-10 dana pred berbu u količini od 15l / ha					
Primenom Slavola obezbeđuje se veći prinos, bolje formiranje i sazrevanje lastara, povećan sadržaj šećera i ukupnih kiselina, što kod vinskih sorti dovodi do harmoničnog bukeva vina. Utvrđen je i uticaj Slavola na diferenciranje cvasti.					

SADNICE UKRASNOG BILJA, ŠIBLJA I ŠUMSKIH VRSTA					
<input type="checkbox"/> potapanje sadnica u 2% rastvora Slavola minimum pola sata pre sadnje. Zalivanje ovim rastvorom po zavrsetku sadnje. <input type="checkbox"/> zalihanje u matičnjacima i rasadnicima u koncentraciji 1-1,5l rastvora Slavola <input type="checkbox"/> folijarno tretiranje Slavolom u koncentraciji 1% ne ostavlja tragove na lišću ukrasnih biljaka <input type="checkbox"/> tretmane izvoditi na 20-30 dana					